

REDUCCIÓN DE ANTIBIÓTICOS

SOLUCIONES FITOGENICAS



# Selko® Fytera Start

## Haga que sus lechones pisen fuerte

### ¿Por qué Fytera Start?



El proceso de destete ejerce presión sobre la salud entérica y la integridad intestinal de los lechones



Fytera Start contiene los extractos de tres plantas, de espectro completo y estandarizado, con más de 5 fitoactivos individuales



Investigaciones independientes demuestran una reducción de la diarrea posdestete y una mejora del crecimiento de los lechones



### Desafío empresarial: No deje que su rentabilidad se vea perjudicada

En el momento del destete, los lechones pierden la protección inmunitaria pasiva que les proporciona la leche de la cerda. El brusco cambio nutricional ligado al destete y otros factores como la mezcla de animales o unas condiciones de alojamiento subóptimas ejercen una presión adicional sobre la salud intestinal de los lechones y pueden comprometer su rendimiento, lo que repercute significativamente en la rentabilidad de la producción porcina.

## Soluciones fitogénicas: Una estrategia integrada

Las soluciones fitogénicas consisten en nuevos ingredientes funcionales de origen vegetal que favorecen procesos fisiológicos y metabólicos específicos en los animales de producción. Los ingredientes de alta calidad y amplio espectro constituyen la base de soluciones muy específicas para los desafíos en la producción ganadera.

### Resultados probados

Los estudios realizados en todo el mundo han demostrado que Fytera Start favorece sistemáticamente la salud intestinal y el rendimiento después del destete. Esto se ejemplifica en las Figuras 1-3 de un estudio de desafío de *E. coli* en lechones destetados.


### Recomendación de uso

Aplicar Fytera Start durante las 2-4 primeras semanas tras el destete.

Fytera Start debe añadirse a una premezcla para garantizar una dispersión homogénea.

### Tasa de inclusión recomendada para lechones después del destete:

▶ 100 g/t de pienso completo



▲ Figura 1: Altura de la vellosidad

▲ Figura 2: Frecuencia de diarrea

▲ Figura 3: Ganancia media diaria

**Figuras 1-3:** Efecto de Fytera Start en la altura de las vellosidades (Figura 1) y la frecuencia de diarrea durante los primeros 5 días post-infección (PI; Figura 2) y la ganancia media diaria (días 0-5 PI; Figura 3) en lechones sin desafiar (Control Negativo) o desafiados oralmente con *E. coli* F18 en el día 7 después del destete (= día 0 PI; Positivo y Fytera Start). Barras con diferentes superíndices (a,b,c) son significativamente diferentes ( $p < 0.05$ ).

Más  
información  
Selko.com

### Resumen:

**Nombre del producto:** Fytera® Start

**Beneficio:** Favorece la salud intestinal tras el destete, a base de ingredientes naturales.

**Uso para:** Lechones destetados.

**Programa:** Soluciones , fitogénicas.  
Programa de reducción de antibióticos.

**Descargo de responsabilidad:** Este documento es provisto únicamente para propósitos informativos y "tal como está" sin garantías de ninguna índole. Ni Selko B.V. ni ninguno de sus afiliados garantiza la exactitud, fiabilidad o integridad de la información en este documento, el rendimiento de cualquier producto o productos mencionados en este documento o los resultados que usted pueda obtener usando dichos productos. Ni Selko B.V. ni ninguno de sus afiliados será responsable por cualquier pérdida, daño, costo o gasto incurrido o que surja como resultado de cualquier persona que use o confíe en cualquier información contenida en esta publicación. Todas las cotizaciones, órdenes, confirmaciones y transacciones están sujetas a nuestra Condiciones Generales de Venta. Estas condiciones de venta pueden ser encontradas en [www.nutreco.com](http://www.nutreco.com) y serán enviadas por escrito a su solicitud. La aplicabilidad de otros términos y condiciones es explícitamente rechazada.